

O GÊNERO *Cuphea* ADANSON (LYTHRACEAE) COMO INFESTANTE
NOS CACAUAIS DO CEPEC

André M. de Carvalho, Sérgio G. da Vinha
Centro de Pesquisas do Cacau
Itabuna, BA

O gênero *Cuphea*, de vasta distribuição geográfica e aproximadamente 103 espécies brasileiras, ocorre nos cacauais do Centro de Pesquisas do Cacau com duas espécies e uma subespécie, invasoras componentes da flora herbáceo-arbustiva, sendo determinadas como:

Cuphea racemosa (L.f.) Sprengel

Cuphea racemosa (L.f.) Sprengel ssp. *hirticaulis* (Hoehne) Lourteig

Cuphea strigulosa H.B. & K.

As plantas são mais frequentes em cacauais novos, onde a maior luminosidade e as condições das plantas para rebrota e germinação favorecem a dispersão, podendo-se usar herbicidas para controle.

Em cacauais formados as espécies ocorrem sem dominância e têm sido controladas pelo processo de roçagens periódicas.

Apresentaremos uma chave e diagnose das espécies assim como as características genéricas de *Cuphea* acompanhadas de desenhos para o reconhecimento prático das plantas a que nos referimos neste trabalho. Também será incluída uma recomendação para o controle com herbicidas.